

La saison tire à sa fin. Les récoltes sont en cours avec des signalements épars de miellées en montagne, laissant l'espoir d'une miellée de sapin.

Miellées de tilleul

De belles miellées ont eu lieu. Des scores de 30Kg à la ruche dans certains secteurs ont été mentionnés. Cependant, dans les Vosges et dans le Jura (plaine), des récoltes ont cristallisé dans les cadres.

Infestation Varroa

Suite à un comptage sur lange de chute naturelle de varroas sur 100 colonies traitées APITRAZ l'année dernière, 90 % des colonies présentent des chutes de 7V/semaine.

Les 10 % restants présentent des chutes importantes et vont faire l'objet d'un traitement d'urgence.


Les chutes naturelles 2018 en semaine 28 sont indiquées par l'étoile rouge.

Pour ce cheptel, cela place l'année 2018 dans une configuration de moyenne infestation.

Il faut cependant être vigilant et ne pas tarder dans le traitement.

GDSA 25 Infestation moyenne en varroas de 2007 à 2009 Traitement APIVAR 10 semaines

Année	2007	2008	2009
Nb varroas	12 830	438	8 498



Nouveauté alimentation varroa

Voici un lien où vous pourrez assister à une conférence d'un chercheur de l'Université du Maryland sur les toutes dernières découvertes concernant varroa et tout particulièrement son régime alimentaire, qui n'est pas l'hémolymph, mais les corps gras de l'abeille.

<https://www.youtube.com/watch?v=DK2Xi0ST4rA>

Loque américaine

Un nouvel arrêté préfectoral a été pris le 2 juillet dernier dans le département de Haute-Saône. Nous ne disposons pas encore à ce jour de la liste des communes concernées. A suivre....

Journée technique élevage 27 juillet 2017

Une journée technique de bilan de la saison suite aux deux journées précédentes se tiendra le vendredi 27 juillet 2018 à Tarcenay, rue sous Velles, chez Christophe Vuillemin.

Prendre contact avec l'ADAFc.