

## Semaine 21

Besançon le 21 mai 2014

### Développement des colonies

L'ampleur du nid à couvain est stable avec 8 cadres.

Sur Belmont, Le pourcentage de couvain operculé est de 50% et sur Parcey de 70%.

Tarcey n'est pas pris en compte suite à la ponction d'essaims,

### Fièvre d'essaimage

Suite à une absence de visite durant deux semaines pour cause de mauvais temps, aucune ruche n'a essaimé sur Belmont, mais 25% présentent des cellules royales.

Le site de Parcey a vu une ruche essaimer mardi 20 mai et la moitié du cheptel présentait encore des cellules royales.


Sur le site de Tarcey, 90% des colonies présentent des cellules.

Sur Montbéliard, la fièvre d'essaimage est jugulée.

### Miellées

#### Acacia

Le secteur dolois est sur la fin de floraison. Le relevé à 22H de l'évolution du poids moyen des colonies sur la période du premier au 19 mai montre une baisse d'environ 3 kilos jusqu'au 16 mai. A compter du 17, elles reprennent du poids pour dépasser celui du 1<sup>er</sup> mai le 19. Sur ces trois jours, les colonies auront pris en moyenne 4,5 kg, dont la moitié le 19.



Le secteur de Montbéliard est sur le premier tiers de la floraison. Hier, le 20 mai, les ruches ont pris 4,5 Kg.



Sur la Haute-Saône, les secteurs les plus tardifs sont en tout début de floraison, le reste oscille entre le premier tiers et la moitié.

### Sapin

Dans les Vosges alsaciennes, le miellat coule déjà avec la présence de nombreux pucerons.

